



# Pasaporte a la cura

## Datos de la farmacia:

---

---

---

## Datos de la clínica:

---

---

## Equipo clínico:

---

---

---

---

---

---

---

## ¿Cuáles son mis medicamentos para el VIH?

---

---

---

---

---

---

## ¿Cuáles son mis otros medicamentos?

---

---

---

---

---

---

## ¿Qué es la coinfección?

La coinfección es cuando una persona que vive con el VIH o con SIDA (PVCS) también está infectada con el virus de la hepatitis C (VHC).

La coinfección por VIH/VHC es un escenario común debido a los factores de riesgo de ambos virus.

La coinfección por VIH/VHC aumenta el riesgo de enfermedad hepática, más severa, insuficiencia orgánica y otros problemas de salud graves.

El tratamiento del VHC en las PVCS debe ser una prioridad.

## ¿Qué tipo de VHC tengo?

(encerrado en un círculo abajo)

Hay 7 genotipos (tipos) de VHC diferentes. Un genotipo es la cepa del virus que tiene en su cuerpo.

**Usted tiene el genotipo:** 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6

## ¿En qué etapa de la enfermedad hepática me encuentro?

La enfermedad hepática se clasifica por "etapas" en base a la cantidad de tejido cicatricial o fibrosis en el hígado:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Fibrosis leve (Etapa 1)      | <input type="checkbox"/> Cirrosis (Etapa 4)               |
| <input type="checkbox"/> Fibrosis moderada (Etapa 2)  | <input type="checkbox"/> Cirrosis descompensada (Etapa 5) |
| <input type="checkbox"/> Fibrosis en puente (Etapa 3) |   |

## ¿Cuál es mi carga viral de VHC después de comenzar la toma de medicamentos contra el VHC?

0-4 semanas \_\_\_\_\_

12 semanas \_\_\_\_\_

24 semanas \_\_\_\_\_

## ¿Cuál fue mi última carga viral de VIH y CD4?

**CV** \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

**CD4** \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

## ¿Qué medicamentos para el VHC estoy tomando?

**Daklinza**<sup>®</sup> (daclatasvir) 1 comprimido por vía oral al día  
 90mg     60 mg     30 mg




**Epclusa**<sup>®</sup> (sofosbuvir/velpatasvir) 400 mg/100 mg  
1 comprimido por vía oral al día



**Harvoni**<sup>®</sup> (ledipasvir/sofosbuvir) 90 mg/400 mg  
1 comprimido por vía oral al día



**Mavyret**<sup>®</sup> (glecaprevir/pibrentasvir) 100 mg/40 mg  
3 comprimidos por vía oral al día con comida



**Ribavirin**<sup>®</sup> 200mg  
\_\_\_\_\_ comprimidos dos veces al día  
con comida



**Sovaldi**<sup>®</sup> (sofosbuvir) 400 mg  
1 comprimido por vía oral al día



**Vosevi**<sup>®</sup> (sofosbuvir/velpatasvir/  
voxilaprevir) 400mg/100mg/100mg  
1 comprimido al día con comida.



**Zepatier**<sup>®</sup> (elbasvir/grazoprevir) 50 mg/100 mg  
1 comprimido por vía oral al día



## ¿Cuánto dura el tratamiento para el VHC?

8 semanas     12 semanas     16 semanas     \_\_\_\_\_ semanas

Este proyecto es/fue apoyado por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) con el número de subvención U10HA28686, Programa de Educación y Centro de Capacitación sobre el SIDA con la suma de 1.500.000,00 dólares. Esta información o contenido y las conclusiones expresadas pertenecen al autor y no deberán ser interpretadas como la posición oficial o política de la HRSA, el HHS o el gobierno de los EE. UU., ni tampoco se deberá inferir que cuentan con el apoyo de los mismos organismos. Última revisión en noviembre de 2018

 **AETC** AIDS Education & Training Center Program  
**National Coordinating Resource Center**